

C. sulcicollis Payk. Est, paraît-il, rare en Belgique. M. de Borre en a reçu deux de Carlsbourg et M. Vincent en a pris un à Bruxelles.

* *Cæliodes bimaculatus*. Cet insecte a été trouvé à Carlsbourg par les professeurs et élèves de l'école normale et à Vliermael-Roodt par M. Maurissen.

* *Baridius quadraticollis* Bohem. M. De Kempeneer a trouvé cet insecte à Saint-Josse-ten-Noode.

En outre je signalerai le *Scolytus multistriatus* Marsh. var. *ulmi*. Chap. pris à Cureghem et le *Scolytus rugulosus* Ratzeb. capturé à Jemeppe, tous deux par M. de Borre.

La séance est levée à 8 3/4 heures.

Assemblée mensuelle du 4 novembre 1876.

PRÉSIDENCE DE M. PUTZEYS.

La séance est ouverte à 7 3/4 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 7 octobre est approuvé.

Le Président fait connaître que le Conseil vient d'admettre comme membre effectif : M. F. Clemm, libraire, à Gand, présenté par MM. Puls et Preudhomme de Borre.

Le Secrétaire donne lecture de la correspondance.

M. L. Lethierry adresse le travail suivant :

HOMOPTÈRES NOUVEAUX D'EUROPE ET DES CONTRÉES VOISINES.

Conosimus corsicus. Testaceus : pedibus et homelytris, præsertim ad suturam, obscure fusco-guttatis : Pronoto et vertice in medio fuscis. Vertex pentagonalis, anticè in medio sat acutè angulatus. Pronoto in medio longior : carinâ tenue longitudinale integrâ verticis, pronoti et scutelli pallidâ. Long. 3 millimètres. — Corse.

C. cæ lato, Muls. similis; vertice longiore, anticè acutiore, differt.

Ressemble beaucoup au *Conosimus cæ latus*, Muls., dont il diffère surtout par le vertex plus long, plus avancé en avant au delà des yeux, son angle antérieur plus aigu.

Issus acuminatus. Testaceus : venis longitudinalibus homelytrorum, abdomineque suprâ, nigris. Angustior : frons tumidula,

antè verticem rotundatim prolongata, carinis lateralibus obsoletis ; pallida, transversè nigro trifasciata. Vertex pentagonalis, latior quàm longior, anticè obtusè angulatus, carinâ longitudinale mediâ nullâ. Homelytra pallida, lateribus ad medium valdè angulatis, posticè valdè attenuatis ; venis longitudinalibus septem nigris, primâ et secundâ ad suturam ante medium conjunctis, terciâ apicè furcatâ, post medium suturæ terminatâ, quartâ et quintâ anticè conjunctis, apicem ipsam homelytrorum attingentibus, sextâ anticè cum septimâ (hac brevior) conjunctâ, illâ longiore, ad apicem terminatâ. Long. 4 1/2 millim. — Oran (Algérie).

Testacé, avec le dos de l'abdomen noir, ainsi que les nervures longitudinales des homélytres. Plus étroit que les autres espèces européennes du genre. Front convexe, dépassant en avant le niveau du vertex, à carènes latérales presque effacées, pâle, avec trois bandes transverses noires, une au sommet, une au milieu et une à la jonction du clypeus. Vertex pentagonal, plus large que long, avancé en angle obtus en avant, mais débordé par le front, sans carène longitudinale au milieu, mais orné en cet endroit d'une ligne longitudinale pâle. Homélytres pâles à nervures noires, en angle très-marqué sur les côtés vers le milieu de leur longueur, diminuant brusquement en ligne droite à partir de cet angle, très-étroites à l'extrémité qui, néanmoins pour chacune, est arrondie ; elles ont chacune sept nervures noires très-marquées ; la première et la deuxième se rejoignent avant d'atteindre la suture avant son milieu, la troisième est divisée en deux avant d'atteindre la suture après son milieu, la quatrième et la cinquième se rejoignent en avant, mais sont prolongées en arrière jusqu'à l'extrémité des homélytres ; la sixième se joint aussi avec la septième en avant, celle-ci plus courte, l'autre atteignant l'extrémité ; une petite nervure supplémentaire se détache en outre en dehors de la septième, vers le tiers antérieur des homélytres, mais ne va guère au delà de l'angle latéral médian. Quelques petites nervures transversales incolores, peu marquées, joignent entre elles les nervures longitudinales.

Cette espèce s'éloigne beaucoup des autres par son front convexe et ses homélytres plus fortement rétrécies à l'extrémité : peut-être devrait-elle former le type d'un nouveau genre ?

J'en ai trouvé deux individus seulement à Oran, au sommet du plateau qui sépare cette ville du village de Misserghin, en avril.

Tettigometra sanguinea. Rubro-sanguinea, clypeo et abdomine nigris. Oblonga, duplo longior ac latior. Frons ad clypeum pallida : vertex pronoto quartâ parte brevior, anticè semicircularis. Homelytra rubro-sanguinea, punctata, lateribus non ciliatis,

anticè ad scutellum tenuissime viridi-marginata. Tibiis suprâ granulatis et setosis. Long. 4 1/2 millim. — Corse, récoltée par M. Damry.

Entièrement d'un rouge sanguin en-dessus, avec la base des homélytres très-finement liserée de vert de chaque côté de l'écusson. Front avec une bande transverse pâle près du clypeus, qui est noir. Pattes d'un rouge sanguin, abdomen noirâtre. Assez robuste, à peu près une fois plus longue que large. Vertex d'un quart plus court que le pronotum, en demi-cercle en avant, presque aussi court au milieu que vers les côtés près des yeux. Bordure latérale des homélytres non ciliée. Tibias garnis en-dessus de granules sétifères assez forts.

Très-voisine de la *T. lepida*, Fieber; en paraît distincte par la forme plus allongée, la couleur d'un rouge uniforme en-dessus, et l'absence de cils au bord latéral des homélytres.

Tettigometra Damryi. Capite, thorace, scutello pedibusque aurantiacis: homelytris viridibus. Brevis: frons ad clypeum pallida: vertex pronoto tertiâ parte longior, anticè obtusè angulatus. Tibiis suprâ granulatis et setosis. Long. 3 1/2 millimètres. — Corse, récoltée par M. Damry.

Par ses tibias garnis sur leurs deux arêtes supérieures de granules sétifères, cette espèce appartient, ainsi que la précédente, à la deuxième division de Fieber: pour la couleur, elle ressemble beaucoup à la *T. lepida*, Fieber; elle s'en distingue à première vue par la longueur du vertex. La tête est d'un rouge orangé, avec la partie du front bordant le clypeus, blanche. Pronotum, écusson, écailles et pattes d'un rouge orangé. Homélytres vertes, à nervures très-peu marquées, même postérieurement.

Ptyelus lugubris. Suprà nigro-piceus, homelytris flavo-maculatis; subtùs flavus, nigro-variegatus. Vertex pronoto angustior, breviter triangularis, anticè obtusè angulatus, margine anticâ leviter reflexâ. Frons leviter convexa, transversè lateribus obsolete sulcata, flava, in medio nigra, sulcisque inferioribus nigris. Pronotum transversè subtiliter rugulosum, sexangulare, margine anticâ rotundatâ, posticâ profundi angulariter emarginatâ. Scutellum quadrangulare, longius quàm latius. Homelytra sub-cultriformia, apicem versùs angustata, apice ipsâ rotundatâ, densissime punctulata, nigra, plurimis maculis in disco, duabusque lateralibus majoribus una oblonga ante medium, altera obliqua post medium, flavis. Tibiæ posticæ spinis duabus extùs ornatæ. Long. 12 1/2 millimètres. — Bords de la rivière Ussuri (Sibérie orientale). Collection Jakowlef.

D'un noir de poix en-dessus, avec les homélytres tachées de flave; le dessous est flave maculé de noir. Vertex plus étroit que le pronotum, d'un tiers moins long que la largeur de ce dernier dans son milieu, brièvement triangulaire, en angle obtus en avant, légèrement rebordé en avant. Front légèrement convexe, avec une série de stries transversales sur chaque côté, flave, avec une grande tache longitudinale médiane noire; le fond des stries inférieures également noir. Pronotum chargé sur toute sa surface de petites stries transversales, sexangulaire, arrondi en avant, profondément échancré en angle en arrière. Écusson quadrangulaire, plus long que large. Homélytres ayant leur plus grande largeur au milieu, rétrécies vers l'extrémité qui est régulièrement arrondie; elles sont densément pointillées, noires, avec quelques taches jaunes indéterminées sur le disque, et deux autres plus grandes et plus nettes sur les bords latéraux, l'une oblongue avant le milieu, l'autre oblique après le milieu. Poitrine noire en grande partie: abdomen noirâtre en-dessus, flave en-dessous. Pieds flaves maculés de noir.

Philænus nebulosus. Oblongus, triplo longior ac latior. suprâ griseus, pube sericeâ vestitus, subtus cum pedibus griseus, nigro-maculatus. Frons brunnea, testaceo-maculatâ, rugulis transversis oblecta. Vertex anticè obtusè angulatus, pronoto brevior et angustior. Pronotum lateribus angustissimum, in medio vertice longius, antè scutellum angulariter emarginatum. Scutellum quadrangulare, æqualiter longum ac latum, apice acutissimâ. Homelytra lateribus regulariter arcuata, apici utrinque rotundata, grisea, lituris plurimis tenuibus hieroglyphicis ornata. Abdomen testaceum, infrâ in medio nigrum. Femora antica et intermedia nigra, apice testacea: tibiæ anticæ et intermediæ nigræ, tarsis pallidis, fusco notatis. Pedes postici pallidi, femoribus suprâ, apiceque spinarum, fuscis. Long. 9 1/2 mill. — Krasnowodsk (Turcomanie). Envoi de M. Jakowlef.

Oblong, trois fois plus long que large, gris en-dessus et couvert d'une pubescence soyeuse dorée, avec les homélytres garnies de petites linéoles irrégulières noires, dirigées dans tous les sens. Vertex en angle obtus en avant, plus étroit et plus court que le pronotum; celui-ci très-étroit sur les côtés, plus long que le vertex au milieu, profondément échancré en angle devant l'écusson. Écusson quadrangulaire, aussi long que large, sa pointe très-aiguë. Homélytres régulièrement arquées sur les côtés, leur extrémité arrondie. Pieds pâles, les cuisses antérieures et intermédiaires noires jusqu'au delà du milieu, les tibias des mêmes paires entièrement noirs; les épines des pieds postérieures noires à l'extrémité, ainsi qu'une tache sur le milieu des cuisses en-dessus.

Bien distinct par sa grande taille et sa largeur plus grande, de toutes les espèces européennes.

Gargara sibirica. *G. genistæ* similis; carinâ mediâ pronoti usque ad verticem prolongatâ, marginem ejus non attingente; in disco pronoti utrinque versûs humeros duabus carinulis minimis, processuque pronoti longiore differt. Long. 4 1/2 mill. — Bords de la rivière Ussuri (Sibérie orientale). Collection Jakowlef.

Entièrement couverte de poils feutrés d'un jaune cuivreux. Vertex noir; pronotum et son prolongement brunâtres, celui-ci plus foncé à l'extrémité, excepté à la pointe extrême, qui est ferrugineuse. Corps et cuisses noirs; tibias et tarses roussâtres. Tout le long du pronotum, une carène médiane bien marquée, depuis la pointe du prolongement jusque près du vertex. Le prolongement du pronotum (processus) est prismatique, styloïde, droit depuis l'arc du pronotum, dépassant visiblement la partie coriace du clavus. Épaules anguleusement proéminentes; entre chacune d'elles, de chaque côté, une petite carène longitudinale arquée en demi-cercle, dont la concavité est dirigée vers l'intérieur. Homélytres obtuses, hyalines, à nervures d'un jaune roussâtre, granulées et séticulées.

Voisine de la *G. genistæ*, Fabr., distincte surtout par la carène médiane du pronotum bien marquée, même sur sa partie antérieure, et par la présence d'une petite carène arquée au-dessus de chaque épaule.

Gargara paradoxa. Præcedenti similis; pronoto suprâ angulos laterales cornuto, processuque posticè suprâ arcuato-gibboso, differt.

Processu postico pronoti à basi retrorsùm producto, scutellum tangente, ad genus *Gargara* pertinere videtur; pronoto cornuto genus *Centrotus* approximât. Long. 5 mill. — Bords de la rivière Ussuri (Sibérie orientale). Collection Jakowlef.

Semblable à la *Gargara sibirica* par la taille et les couleurs, elle n'en diffère que par le pronotum garni en-dessus de chaque épaule d'une corne courbée en arrière, de même forme que la corne du *Centrotus chloroticus*, Fairm., mais un peu moins longue; elle ne dépasse pas le niveau des flancs du pronotum. Comme chez la *G. sibirica*, une carène longitudinale bien marquée couvre le pronotum et vient aboutir près du vertex; le prolongement du pronotum, au lieu d'être droit en-dessus, est un peu gibbeux postérieurement. ♀, gaine de la tarière d'un jaune roussâtre à la base en-dessous, noirâtre sur les bords et à l'extrémité; tarière noirâtre, à peine plus longue que la gaine.

Quoique, par les cornes du pronotum, cette espèce se rapproche des *Centrotus*, la forme du prolongement de ce pronotum, contigu à l'écusson, doit la faire ranger avec les *Gargara*; peut-être pourrait-elle faire partie du genre *Tricentrus*, Stål, que je ne connais pas.

Pediopsis bipunctata. Ovata, testacea, suprâ nitida, glabra. Capite flavo, fronte apud oculos nigro-bipunctato; pronoto scutelloque pallidis. Pronoto longitudine duplo latiore, anticè obtusè angulariter producto, posticè arcuatim emarginato, suprâ medio anticè subcarinato, confertim obliquè aciculato-rugoso: scutello ante apicem transversim angulariter impresso: homelytris castaneis. Long. 4 1/2 mill. — Environs de Toulouse. Envoi de M. Marquet.

Affinis *P. tiliæ*; fronte bipunctata, pronoto anticè magis prolongato, staturâ minore, etc., differt.

Ovale, entièrement d'un testacé plus ou moins pâle; brillante et glabre en-dessus, avec les homélytres d'un châtain-marron, et le front orné près des yeux d'un point noir de chaque côté. Ressemble beaucoup à la *Pediopsis tiliæ* Germ., mais le pronotum est beaucoup plus prolongé en avant en angle obtus, comme chez les *P. ulmi*, Scott, et *cerea*, Germ.; elle diffère de ces dernières, dont elle a la taille, par la forme moins étroite et les deux points noirs du front.

Agallia dorsalis. Testacea: vertice maculis duabus obliquis parvis, sæpè deficientibus. Pronoto punctulato, nec transversim strigoso, testaceo: scutello homelytris testaceis. Abdomine suprâ testaceo, in disco longitudinaliter nigro-vittato, infrâ testaceo, in medio nigro: pedibus testaceis. Long. 2 1/2 à 3 mill. — Médeah (Algérie).

Forma brachyptera: homelytris abdomine triplo brevioribus, apicè obliquè truncatis: alis rudimentaribus: pronoto vertice vix duplo longiore et longitudine suâ plus quàm triplo latiore.

Variat: pronoto lateribus nigro, homelytris fuscis, venis testaceis; abdomine in medio et lateribus utrinque nigro vittato. — Edough, près Bône (Algérie).

Testacée, avec une ligne longitudinale noire sur le dos de l'abdomen, et quelquefois deux petites taches noires obliques sur le vertex. Le pronotum est assez rugueusement pointillé, mais sans stries transversales distinctes.

Brachyptère: homélytres trois fois plus courtes que l'abdomen, tronquées obliquement à l'extrémité; pronotum à peine du double plus long que le vertex, et plus de trois fois plus large que long.

Une variété que j'ai trouvée au sommet du mont Edough, près de Bône, en compagnie de M. Puton, a les côtés du pronotum noirs, les homélytres brunes avec toutes leurs nervures testacées, et une bande latérale noire supplémentaire de chaque côté de l'abdomen. Cette espèce diffère de l'*Agallia brachyptera*, Bohem., outre la couleur de l'abdomen, par l'absence de stries transversales visibles au pronotum.

Tettigonia semiglaucæ. Vertex triangularis, pronoti longitudine, flavus, anticæ niger. Frons convexiuscula, flava, anticæ ad suturam verticis nigro bimaculato. Pronotum glauco-griseum. Scutellum glauco-nigrum, in medio lineâ pallidâ longitudinale vittatum. Homelytra glauco-grisea, pallido limbata. Subtus cum pedibus pallidissima. Long. 7 millim. — Bords de la rivière Ussuri (Sibérie orientale). Collection Jakowlef.

Dessus d'un gris glauque à reflets bleuâtres, excepté la base du vertex, une ligne longitudinale médiane de l'écusson et la bordure latérale des homélytres, qui sont d'un flave pâle. Dessous du corps et pieds pâles. Vertex en triangle obtus en avant, aussi long que le pronotum. Front assez convexe, jaune, avec deux taches noires à son sommet.

Penthimia nitida. Nigra, nitida, glabra : capite pronotoque transversè obsolete strigosis : homelytris nigris, nitidis, apice decoloribus et pellucidis, in disco postico lævigatis, nitidissimis. Affinis *P. atræ*, Fabr., nitidior, glabra, rugis transversis pronoti minus evidentibus ; disco postico homelytrorum polito, nitidissimo, differt. Long. 5 millim. — Bords de la rivière Ussuri (Sibérie orientale). Collection Jakowlef.

Noire, glabre, luisante. Vertex garni en avant de petites stries transversales, presque lisse en arrière. Pronotum et écusson couverts de petites stries transversales moins prononcées que chez la *Penthimia atræ*, Fabr. Homélytres noires, excepté à l'extrémité, où se trouve une tache vitreuse, transparente, sinuée, remontant sur la suture jusqu'à l'extrémité du clavus. Au milieu de cette tache vitreuse, un assez gros point noir touchant presque la suture, de chaque côté, au milieu de l'espace compris entre l'extrémité du clavus et celle des homélytres. La tache vitreuse est finement bordée de noir en dehors. Clavus à bord terminal jaune, tronqué. Cories lisses, luisantes, surtout sur le disque, ayant seulement de petites rugosités le long de la suture du clavus et sur la partie antérieure de leur bord externe. Dessous et pattes noirs, avec la tranche externe des tibias maculée de jaune.

Acocephalus elongatus. Longior, subtiliter punctulatus: vertice pronoto distinctè longiore, apice paulo reflexo, suprâ pone ocellos et in medio longitudinaliter subearinato, ocellis ab apice capitis dimidio magis quàm ab oculis positis: fronte convexiusculâ, latitudine basale longiore, marginibus lateralibus leviter rotundatis. Long. 5 millim.

Mas: laminis genitalibus elongatis, latitudine ferè triplo longioribus, subverticaliter positis, apicem versus paulo angustatis et reflexis, apice obtusiusculis: flavus, abdomine paginâque superiore corporis fusco-nigris, tribus irregularibus transversis homelytrorum fasciis albis, primâ ante medium, in disco utrinque interruptâ, secundâ arcuatâ post medium, tertiâ apicale. — Sarepta (Russie méridionale).

Cette espèce, dont je n'ai vu que des ♂, ressemble aux ♂ des *Acocephalus bifasciatus*, Linn., et *interruptus* Scott; mais le pronotum est dépourvu de fascie blanche; la forme est plus allongée que chez les autres espèces. Le dessus du corps est d'un noir brunâtre avec trois bandes blanches transversales sur les homélytres, la première avant le milieu, interrompue sur le disque de chaque côté, divisée par conséquent en trois lobes, un médian sur la suture et deux latéraux; la deuxième bande, arquée en arrière après le milieu; la troisième apicale.

Selenocephalus corsicus. Oblongo-elongatus, griseo-testaceus, nigro-sparsus. Vertex semicircularis, antice reflexus, latissimus, pronoto triplo brevior: vertex, pronotum et homelytra undique punctis et lituris minutis nigris irregularibus oblecta: homelytris apice nigris et lateribus posticis evidentiùs nigro-maculatis. Pronotum transversè strigosus. Abdomen subtùs nigrum, punctis plurimis testaceis ornatum: pedibus testaceis, incisuris spinarum nigris. Long. 7 1/2 millim. — Corse.

Ressemble pour la forme et la structure du vertex aux *Selenocephalus obsoletus*, Germ., et *lusitanicus* Signoret, mais taille plus petite, corps plus étroit, couleur plus obscure; homélytres plus uniformément parsemées de petits traits noirs, sans cellules blanches immaculées, ayant seulement quelques petites taches hyalines au delà de la seconde moitié de leur longueur, sur le bord latéral même; elles sont presque complètement noires à l'extrémité.

Cicadula opacipennis. Vertex anticè rotundatus, suturâ frontis cum vertice convexâ, fronsque, lutei, vertice basi fusco-bipunctato. Pronoto pallido, obsoletissimè fusco quadrivittato. Scutellum pallidum, basi mediæ tenuiter fusco bipunctato, in disco brevissimè et tenuissimè fusco bilineato. Homelytra opaca, venis

luteis opacis, cellulis albo-lacteis. Abdomen suprà nigrum, segmentis omnibus citrino apice marginatis, subtùs in medio nigrum : coleostro et vaginà feminæ flavis. Pedes pallidi, incisuris spinarum et articulationibus tarsorum fuscis. Long. 2 1/2 millim. — Environs d'Astrakhan (Russie méridionale). Collection Jakowlef.

Vertex arrondi en avant, ayant en longueur la moitié de celle du pronotum ; bord du vertex arrondi à sa jonction avec le front ; celui-ci, ainsi que le vertex, d'un jaune sale ; deux petits points bruns au milieu sur la base même du vertex. Pronotum pâle, avec quatre bandes longitudinales d'un jaune foncé peu nettement indiquées. Écusson pâle, avec deux très-petits points au milieu de la base, et deux autres petits points linéaires au-dessous, sur le disque, bruns. Homélytres opaques, toutes leurs nervures d'un jaune gris assez foncé ; ces nervures sont assez nettement indiquées, surtout à l'extrémité, et les cellules qu'elles forment sont d'un blanc mat. L'abdomen est noir en-dessus avec tous ses segments finement marginés postérieurement de jaune. Ventre noir au milieu, parties génitales de la ♀ flaves. Pieds pâles, avec les points d'insertion des épines et les articulations des tarse bruns.

♀ gaine dépourvue de soies dressées.

Cicadula diminuta. *C. sex-notatae* simillima : verticis punctis minoribus, scutelloque immaculato, differt. Long. 3 millim. — Forêt de Nieppe, près Hazebrouck (Nord).

Ressemble beaucoup à la *Cicadula sex-notata*, Fall, n'en diffère que par la taille généralement plus petite, les taches du vertex plus petites et l'écusson immaculé. Le vertex, le pronotum, l'écusson et les homélytres sont d'un jaune paille luisant.

Cicadula vittiventris. Vertex anticè rotundatus, sutura frontis cum vertice convexa, frons, clypeus, scutellum, homelytra pedesque citrino-virides, immaculati. Abdomen suprà nigrum, citrino limbatum, segmentis omnibus citrino apice marginatis ; subtùs in medio nigrum. Segmentis genitalibus, coleostro et vaginà ♀ citrinis. Pectore citrino, nigro-maculato. ♀, Coleostro subtùs setis erectis flavis ciliato. Long. 3 mill. — France méridionale, Cassis (M. Puton) ; Russie méridionale, Astrakhan (M. Jakowlef).

D'un jaune vert en-dessus. Vertex arrondi en avant, ayant en longueur la moitié de celle du pronotum. Bord du vertex arrondi à sa jonction avec le front ; celui-ci, ainsi que le vertex et l'écusson, d'un jaune citron, sans taches. Homélytres semi-transparentes, avec leurs nervures d'un jaune citron, nettement indiquées. Poitrine jaune maculée de noir ; pieds pâles. Abdomen noir en-dessus, bordé de jaune, tous ses segments finement et nettement marginés

de jaune à leur extrémité ; noir au milieu en-dessous, les parties génitales jaunes.

♀ avec la gaine garnie en-dessous d'assez longues soies dressées, jaunes.

Ressemble à la *Cicadula salsolæ*, Puton, mais la couleur est plus verte, uniforme, la taille moindre et l'abdomen maculé d'une manière différente en-dessus.

Aconura (novum genus).

Vertex magnus, triangularis, anticè obtusus, posticè arcuatim emarginatus, in medio pronoto duplo major : oculis magnis, oblongis, obliquè sitis : sutura verticis et frontis convexa. Clypeus quadrangularis, elongatus, dimidiæ parti frontis æqualis. Pronotum breve, angulis rotundatis, anticè semicirculare. Tarsi postici articulo primo duobus sequentibus simul sumptis æquales, secundo tertio dimidiâ parte brevior. Homelytra in macropteris evidenter appendiculata.

♀, vagina cum coleostro abdomine longior, vaginâ coleostro suprâ duplo majore.

Vertex très-développé, en triangle obtus en avant, échancré en arc en arrière, ayant dans son milieu deux fois la longueur du pronotum. Yeux grands, oblongs, placés obliquement. Point de jonction du vertex avec le front convexe. Clypeus quadrangulaire, allongé, de moitié aussi long que le front. Pronotum court, semi-circulaire en avant, à angles arrondis. Article basilaire du tarse postérieur aussi long que les deux suivants réunis, le deuxième moitié plus court que le troisième. Homélytres plus courtes que l'abdomen chez les individus brachyptères, aussi longues que lui chez les individus macroptères, et garnies alors d'un appendice bien visible.

♀ gaine et tarière ensemble plus longues que le reste de l'abdomen : tarière dépassant le niveau de la gaine de toute la longueur de celle-ci en-dessus.

Ce genre semblerait faire le passage des *Cicadula* et *Thamnotettix* aux *Deltocephalus* ; il est remarquable par le développement du vertex, des yeux et des organes génitaux.

Aconura Jakowlefi. Flavo-grisea, fronte transversè fusco striolatâ. Abdomine suprâ anticè nigro, posticè flavo, nigro maculato ; subtùs nigro, segmentis posticis genitalibusque flavis : pedibus flavis, tibiis suprâ, incisuris spinarum, unguis, articulationibusque tarsorum posticorum fuscis, interdum totis flavis.

Forma macroptera ♀ homelytris appendiculatis, abdomini usque ad initium vaginæ, suprâ æqualibus.

Forma brachyptera ♀ homelytris simplicibus, posticè separatim rotundatis, penultimum abdominis segmentum non superantibus. Long. (cum vaginâ) 4 1/2 à 5 mill. — Astrakhan (Russie méridionale). (M. Jakowlef.)

D'un gris flave en-dessus ; front avec de fines stries transversales brunes, Abdomen noir en-dessus sur sa partie antérieure, flave maculé de noir en arrière ; noir en-dessous, avec les derniers segments et les parties génitales flaves. Pieds flaves avec la tranche supérieure des tibias, les points d'intersection des épines et les articulations des tarsi postérieurs, bruns ; souvent ils sont entièrement flaves.

Forme macroptère ♀. Homélytres avec un appendice membraneux bien marqué, dont les bords se recouvrent ; elles atteignent en-dessus la naissance de la tarière.

Forme brachyptère ♀. Homélytres courtes, sans appendice, arrondies chacune séparément à l'extrémité, ne dépassant pas le milieu de l'avant-dernier segment abdominal.

Aconura volgensis. Vertex pallidus, in disco duabus maculis transversis nigris, suturâ verticis et frontis in medio nigro-bipunctatâ : fronte pallidâ, transversè fusco striolatâ. Scutellum et homelytra pallida. Abdomen anticè suprâ et subtus nigrum, posticè suprâ flavum punctis nigris minimis variegatum, subtus flavum : pedes pallidi, articulationibus tarsorum fuscis.

♀, coleostrum suprâ et subtus setis erectis flavis ciliatum (1).

Forma brachyptera ♀, homelytris vix dimidium abdominis superantibus. Long. 4 mill. — Astrakhan (Russie méridionale). (M. Jakowlef.)

Vertex, écusson et homélytres pâles. Sur le disque du vertex deux petites taches transverses noires, et deux points noirs au milieu de l'espace séparant le front du vertex. Front pâle, striolé transversalement de brun. Pronotum pâle, traversé de quelques bandes longitudinales blanches peu visibles, et parsemé de quelques points enfoncés suivant les contours du bord antérieur. Premiers segments abdominaux noirs en-dessus et en-dessous, les derniers flaves, parsemés de points noirs en-dessus, entièrement

(1) Je viens seulement d'avoir en communication le mâle d'un insecte dont je n'avais pu décrire que la femelle dans mon manuscrit.

♂ brachyptère. Abdomen noir, avec l'avant-dernier segment flave en-dessus et en-dessous. Dernier segment abdominal en cône obtus, comprimé sur les côtés, une fois plus long que le précédent, garni en-dessous d'une brosse de cils raides, flaves. — Long. 3 mill.

Tête, corselet, écusson, homélytres et pattes comme chez la ♀.

flaves en-dessous. Pieds pâles, avec les articulations des tarsi brunes.

♀ gaine garnie de soies dressées jaunes en-dessus et en-dessous.

Forme brachyptère ♀ : homélytres dépassant à peine le milieu de l'abdomen.

Voisine de l'*A. Jakowlefi* ; bien distincte par les taches du vertex, et les petits points noirs qui garnissent le dos des derniers segments de l'abdomen.

Athysanus tigripes. Oblongus, griseo-viridis, nitidus. Vertex anticé semicirculariter rotundatus, griseo-viridis, punctis minutissimis nigris obtectus. Homelytris griseis, punctis minutis nigris obtectis, appendice membranæ minimâ. Pedibus pallidis, femoribus anterioribus et intermediis nigro-irroratis ; tibiis posticis suprâ nigro lineatis, incisuris spinarum fuscis. Long. 3 1/2 à 4 mill. — Astrakhan (Russie méridionale) (M. Jakowlef).

Voisin des *Athysanus scutellaris* et *Pallasi*, et formant le passage entre ces deux espèces : il diffère de toutes deux par sa taille moindre, sa forme moins allongée, et les taches noires des pattes.

Notus juniperi. Griseo-viridis, abdomine suprâ nigricante : vertice anticé angulariter producto, basi inter oculos longitudine mediâ duplo latiore, posticè rotundato-emarginato : oculis longitudine suâ latioribus : pronoto posticè rectè truncato, anticè arcuatim valde producto. Homelytris flavo-virentibus, venis maculâque interdum indistinctâ utrinque discoidale ante medium, albis : membranâ subcoriaceâ. Long. 3 mill. — Batna (Algérie).

Espèce remarquable par la forme de son vertex, très-anguleux en avant, et celle de son pronotum, fortement prolongé en arc en avant, qui lui donnent un peu le faciès d'une *Pediopsis*. — J'en ai pris plusieurs individus en mars, en compagnie de M. Puton, en battant des genevriers, dans les environs de Batna (Algérie).

Notus ignicollis. Orichalceo-flavus, elongatus, abdominis, segmentis suprâ flavis, basi nigris, subtus flavis. Vertex anticé obtuse angulariter producto, basi inter oculos longitudine mediâ duplo latiore, posticè rotundato-emarginato : oculis altitudine suâ valdè latioribus, posticè angustatis. Pronoto posticè obtusè emarginato, disco basale plagâ magnâ semicirculari aurantiacâ-rutilâ ornato. Long. 4 mill. — Je n'en ai vu qu'un exemplaire ♀, sans indication de localité, provenant de la collection Fieber.

Ressemble au *Notus flavipennis* Fabr., mais plus grand et distinct à première vue par la belle tache semi-circulaire couleur de feu de la base de son pronotum.

Notus albicans. Flavo-albidus, abdomine suprâ vittis nigris transversis ornato : pronoto, scutello homelytrisque albis, nitidis. Vertice anticè obsolete angulariter parum producto, basi inter oculos longitudine mediâ duplo latiore : oculis mediocribus, altitudine suâ latioribus, posticè angustatis. Pronoto postice obtusè emarginato : scutello in medio transversè sulcato. Long. 3 1/4 mill. — France méridionale, Aigues-Mortes.

Forme et vertex comme chez les *Notus molliculus* Bohem., *facialis* Flor, et *Schmidti* : distinct par la couleur blanche du pronotum, de l'écusson et surtout des homélytres.

Eupteryx corsica. Elongata, subtus nigra : fronte flavo-maculatâ, pedibusque flavis, femoribus posticis infuscatis : suprâ nigro et flavo variegata. Vertice lunato, nigro, anticè et lateribus flavo-limbato. Pronoto flavo, in medio vittâ longitudinale interruptâ fuscâ ornato. Scutellum nigerrimum. Homelytris fuscis, duabus fasciis arcuatis interruptis flavis ornatis, unâ ante, alterâ ad medium ; duabusque maculis flavo-pellucidis ad latera postica : membranâ obscurâ. Abdominis segmentis suprâ nigris, tenuissimè flavo posticè marginatis.

Affinis *E. auratæ* Linné, et *carpini* Fourcr. ; colore obscuriore distincta. Long. 4 mill. — Corse.

Voisine de l'*Eupteryx aurata* Linné ; même taille, même forme, mais s'en éloigne considérablement pour la couleur.

Eupteryx Putoni. Angusta, suprâ flavo-pallida, homelytris flavo-fusco variegatis, abdominis dorso nigro. Vertex lunatus, in medio antice vix productus, maculis duabus anticis triangularibus, duabusque basalibus minutis rotundatis, nigris, ornatus : fronte anticè nigro-bipunctatâ, genisque nigris. Pronoto longitudine suâ duplo latiore et quàm vertice dimidio longiore, lineis quatuor longitudinalibus obsolete fuscis ornato : scutello basi duobus punctis minutissimis nigris ornato, in medio transversè tenuissimè evidenter sulcato. Homelytris sicut in *E. melissæ* Curtis, maculatis : pedibus pallidis. Long. 2 1/2 à 3 mill. — Prise en nombre en septembre par M. Puton, à Balaruc (Hérault).

Très-voisine de l'*Eupteryx melissæ* Curtis, dont elle diffère par la couleur plus pâle et le vertex orné de quatre taches au lieu de trois.

M. de Borre annonce que M. Lethierry vient de se charger d'étudier, pour les publier dans nos Annales, les Hémiptères du voyage de notre regretté collègue Camille Van Volxem en Portugal, Espagne et Maroc.