

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

par décret du 23 août 1878

Natura maxime miranda in minimis

6^e SÉRIE. — TOME DIXIÈME



PARIS

AU BUREAU DU TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ

M. le D^r A. FUMOUCHE

rue du Faubourg-Saint-Denis, 78

1890

Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

9^e Mémoire (1).

HÉMIPTÈRES HOMOPTÈRES

Par L. LETHIERRY.

Séance du 26 mars 1890.

Cicadides.

1. TYMPANOTERPES GRISEA Germ. — Puerto-Cabello (1 exemplaire ♂).
2. FIDICINA PERTINAX Stål. — Valencia (1 exemplaire ♀).

Fulgorides.

3. PÆCILOPTERA UMBRACULATA Fabr., *Syst. Rhyngot.*, p. 50. — Puerto-Cabello (1 exemplaire).
4. ORMENIS BRASILIENSIS Spin. — San-Esteban (1 exemplaire).
5. PHALÆNOMORPHA INCUBANS Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 525. — San-Esteban (1 exemplaire ♂).
6. **Ricania vitripennis**, n. sp. — *Pallide virescens* : *elytris hya-*

(1) Voir 1^{er} mémoire (*Dytiscidae et Gyrinidae*, par le D^r M. Régimbart), Annales 1888, p. 379; — 2^e mémoire (*Cucujidae, Rhysodidae, Dryopidae, Cyathoceridae, Heteroceridae*, par Ant. Grouvelle), Annales 1889, p. 157, pl. 6; — 3^e mémoire (*Temnochilidae*, par A. Lèveillé), Annales 1889, p. 167; — 4^e mémoire (*Arachnides*, par E. Simon, commencement), Annales 1889, p. 169; — 5^e mémoire (*Lathridiidae*, par le R. P. P.-M.-J. Belon), Annales 1889, p. 221; — 6^e mémoire (*Eumolpidae*, par Éd. Lefèvre), Annales, 1889, p. 329; — 7^e mémoire (*Formicides*, par C. Emery), Annales 1890, p. 55; — 8^e mémoire (*Orthoptères*, par Ignacio Bolivar), Annales 1890, p. 137.

linis, apice leviter fumatis, stigmatè quinque-venoso, evidentius fumato sed pellucido : vertice antice truncato, in medio parum angulato, oculo fere duplo latiore : fronte elongata, in disco tricarinata, carina media acuta, distinctissima. Pronotum lateribus angustis, medio antice productum, ibique antice rotundatum, vertice in medio duplo longius. Mesonotum tricarinatum, carinis fuscis. Elytra ampla, corpore duplo longiora, in disco et præsertim ad apicem venis numerosis transversis reticulata, venis lateralibus transversis, apicalibus longitudinalibus regulariter dispositis, simplicibus, nec reticulatis, quibusdam furcatis; clavo venis transversis tantum duabus ad apicem instructo; venis omnibus, longitudinalibus et transversis elytrorum fuscis : tibiis posticis quinquespinosis, — Long. corporis : 7 mill.; cum elytris, 12 mill. — Caracas (2 exemplaires ♂).

Forme de *R. reticulata* Fabr., mais plus petite; les élytres, entièrement transparents, même dans les endroits enfumés, sont remarquables par leur stigma assez grand, transparent, quoique fortement enfumé, et traversé par cinq nervures internes noires, obliquement transversales.

7. *Dascalìa lurida*, n. sp. — *Lurida, elytris nigro-maculatis.* Vertex antice truncatus, latior quam longior, ante oculos paulo productus, in medio fuscus. Frons concava, latior quam longior, in disco basali carina brevissima instructa. Pronotum verticis longitudini æquale, in medio longitudinaliter fusco-vittatum. Mesonotum luridum, nec carinatum. Elytra ad humeros amplissima, rotundata, lateribus ad apicem sinuata, post apicem clavi leviter sursum elevata; angulo suturali ante apicem rotundato, apice ipso distincte sinuato; clavo granulato, venis non distinctis, lurido, macula longitudinali nigra utrinque ad suturam instructo; corio lurido, maculis duabus nigris ornato, una transversa, irregularis, interrupta, ad medium, altera longitudinalis, arcuata, ad marginem lateralem posticum; apice ipso fusco-limbato : venis in disco longitudinalibus obliquis, nec reticulatis, ad apicem dense reticulatis, venis lateralibus transversis. Corpus testaceum, pedibus flavis, tibiis posticis ad apicem trispinosis. — Long. cum elytris : 6 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

Ressemble à *D. sinuatipennis* Stål. Taille moitié moindre; coloration différente; élytres plus fortement élargis aux épaules.

8. *Pintalia discoidalis*, n. sp. — *Fusco-testacea, pedibus pallidioribus : mesonoto tricarinato, utrinque flavescente : elytris sordide hyalinis, venis partis anterioris concoloribus, minute et parum distincte*

granulatis, venis partis apicalis nigris; stigmatе ferrugineo, basi fusco. Vertex longitudine paulo latior; frons latitudine nonnihil longior, carinis marginalibus acutissimis, subfoliaceis, super verticem continuatis, carinula media a basi ultra medium frontis distincta, apicem versus evanescente. — Long. 4 mill.; cum elytris, 6 mill. — Colonie Tovar (2 exemplaires).

9. **Hyalesthes basalis**, n. sp. — *Fuscus, pedibus pallidis, elytris hyalinis, basi fuscis. Vertex paulo longior quam latior, fuscus, carinis marginalibus basi flavis, apice fuscis. Frons fusca, carinis et sutura frontis et verticis flavis. Pronotum flavum, scapulis flavis. Mesonotum quinquecarinatum, fuscum, carinis et interstitiis carinarum flavis. Elytra hyalina, basi flavo-fusca, venis concoloribus, subgranulatis, apicem versus simplicibus, nigris: stigmatе nigro, basi albo. — Long. 3 1/2 mill.; cum elytris, 5 mill. — Caracas (1 exemplaire).*

10. **DICTYOPHORA VIRESCENS** Spin., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, p. 300. — San-Esteban (1 exemplaire).

11. **DICTYOPHORA VIRIDATA** Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 64. — San-Esteban (1 exemplaire).

12. **DICTYOPHORA NIGRONOTATA** Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 65. — Caracas (1 exemplaire).

13. **ISSUS PRASINUS** Spin., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1839, p. 349. — CorozaI (1 exemplaire).

14. **ISSUS LONGIPENNIS** Spin., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1839, p. 348. — San-Esteban (2 exemplaires).

15. **ISSUS COLUMBIÆ?** Walker, *List of Homopt.*, p. 361. — San-Esteban, Colonie Tovar (4 exemplaires).

16. **ISSUS INSTABILIS?** Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 9. — Caracas, CorozaI (2 exemplaires).

17. **ISSUS TESTACEUS** Walker, *List of Homopt.*, p. 368. — Caracas, San-Esteban (3 exemplaires).

18. **Issus longulus**, n. sp. — *Elongatus, fusco flavoque variegatus. Vertex flavus antice truncatus, fere duplo latior quam longior; oculis magnis, verticis latitudine æqualibus. Frons longior quam latior, in medio carinata, fusca, basi et marginibus flava, macula media sat magna*

longitudinali oblonga flava. Pronotum et mesonotum flava, unicarinata, carina usque ad apicem verticis continuata. Elytra abdomen valde superantia, fusca, clavo flavo, margine laterali a medio usque ad venas apicales late flavo pellucido, venis longitudinalibus corii venis subtilioribus transversis conjunctis; venis apicalibus simplicibus, sat longis, ab ultima vena transversa usque ad apicem ipsum in radium dispositis. Abdomen subtus fuscum, flavo-conspersum : pedibus pallidis. Forma elongata, colore elytrorum, necnon longitudine elytrorum et venarum apicalium distinctissimus. An hujus generis? ♂. — Long. 4 mill.; cum elytris, 6 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

19. **Cyarta granulata**, n. sp. — *Testacea, nigro variegata. Vertex duplo latior quam in medio longior, antice in angulum distinctum productum, testaceus, striga laterali utrinque, summoque apice nigris, in medio striola impressa longitudinali cum striola transversa arcuata utrinque cunjuncta, instructus. Frons æque longa ac lata, nec carinata, flava, ad suturam verticis nigro-marginata. Pronotum testaceum, punctis sat magnis duobus nigris disci antici, punctis minimis utrinque subapicalibus, nec non margine fere toto laterali, nigris. Mesonotum obsolete tricarinatum, testaceum, maculis minutis longitudinalibus disci, duabus anticis, duabus posticis, maculisque tribus angulorum lateralium, nigris. Elytra testacea, punctis nigris raris hic illic conspersa, granulis distinctis elevatis, clavi basalibus, plurimis infra callum humerale, necnon plurimis marginis anterioris, instructa : venis longitudinalibus venulis transversis conjunctis : regione subapicali ad apicem clavi reticulata, venis et cellulis hic illic viridi-tinctis : margine laterali antice sat valde expanso, humeris rotundatis. Corpore subtus pallido, pedibus pallidis. — Long. 8 mill. — Puerto-Cabello (1 exemplaire).*

20. **Asiraca insignicornis**, n. sp. — *Ferruginea, ventre nigro, pectore flavo. Vertex longior quam latior, antice angustatus, ferrugineus, antice niger, foveolis duabus disci, strigisque duabus apicalibus instructus. Frons longior quam latior, ferruginea, nigro variegata. Antennæ biarticulatae, corporis longitudini $\frac{3}{4}$ æquales, granulis minutis numerosis setisque brevibus nigris obtectæ; primo articulo basi gracili, subito in folium expanso, infra parum, et recte, supra valde rotundato, ferrugineo, basi pallidiore; secundo articulo infra parum et recte, supra valde dilatato, rotundato, tertia parte apicali valde diminuta, apice acuta, basi ferrugineo, parte secunda apicali nigra, linea alba longitudinali laterali utrinque ornata, seto unico longo albo terminata. Pronotum flavum, in*

disco punctis duobus impressis, scapulis flavis. Mesonotum ferrugineum, non carinatum, strigis minutissimis transversis dense obtectum. Elytra ferruginea, versus apicem obscura, intervallo marginali (ante apicem paulo dilatato) flavo : venis albis, granulibus nigris numerosis unisetosis sat distantibus ornatis. Ventre nigro, apice medio segmentorum et valva genitali flavis : pectore flavo, prosterno et mesosterno nigro-maculatis. Pedibus pallidis, tarsis posticis longis nigris. — Long. 5 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

Curieux insecte, remarquable par la structure des antennes.

21. **Aræopus conspersinervis**, n. sp. — Pallidus, elytris hyalinis, venis nigro et albo maculatis. Vertex pallidus, paulo latior quam longior, foveolis magnis duabus basalibus, minoreque profunda apicali, instructus. Frons ferruginea, tricarinata, albo variegata. Pronotum flavum, lateribus nigrum, unicarinatum. Mesonotum ferrugineum, tricarinatum, carinis pallidis. Elytra flavo-hyalina, ad apicem paulo infumata, abdomine multo longiora, venis maculis numerosis alternis albis et nigris distincte ornatis. Corpore subtus et pedibus pallidis. ♀. — Long. 5 mill.; cum elytris, 6 mill. — Caracas (2 exemplaires).

Dichoneura, nov. gen. — Vertex triangularis, æque longus ac latus, antice productus, oculos longitudine oculi superans, basi et lateribus carinatis, sat elevatis, apice in angulum obtusum desinentibus; in disco in carinam obtusam elevatus, utrinque inter carinam mediam et carinas laterales concavus. Frons triplo longior ac latior, tricarinata, carinis lateralibus angustis, acutis, carina media lata, convexa; sutura frontis et verticis convexa. Antennæ brevissimæ, bi-articulatæ, articulis longitudine æqualibus, æque longis ac latis, ultra carinam lateralem frontis non productæ, seto longo terminatæ. Elytra longa, longe ultra apicem abdominis producta, apice utrinque rotundata, in dimidio antico venis tribus simplicibus, una suturam externam clavi formans, secunda discoidalis, tertia submarginalis, his venis vena transversa irregulari valida obliqua et undata paulo post medium inter se et cum vena marginali conjunctis : post venam transversam venæ sex septem cellulas cum cellula suturali formant, ante apicem serie irregulari arcuata venarum transversarum terminatas : venis apicalibus decem aut undecim, sat longis. Tibiæ posticæ spinis tribus ante apicem, setisque numerosis spinosis intus et extus armatæ, calcaribus duobus, interno minore, trifido, externo simplice, terminatæ.

Ce genre est voisin du genre DELPHAX Fabr.

22. **Dichoneura Simoni**, n. sp. — *Flava* : puncto in sutura verticis et frontis nigro. Elytra flava, pellucida, clavo basi ipsa nigro, fasciæque sub-basali irregulari clavi et corii fusca; venis longitudinalibus disci flavis, transversis omnibus et apicalibus nigris : stigmatibus nigris, maculaque semicirculari apicis nigra. Corpus pallidum, pedibus pallidis, tarsis anticis nigris, intermediis et posticis fuscis. ♂. — Long. 6 mill.; cum elytris, 8 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

Cercopides.

23. **Tomaspis equestris**, n. sp. — *Ovalis, nigra, nitida, fascia transversali sat lata in medio elytrorum læte rubra. Caput læve; pronotum et scutellum punctulata; elytris magis crebre punctatis, pube tenui nigra in partibus nigris, flava in fascia rubra, obtectis. Corpore subtus et pedibus omnino nigris.* — Long. cum elytris, 6 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

24. **MONECPHORA BIFASCIA** Walker, *List of Homopt.*, p. 679. — Caracas (1 exemplaire ♂).

25. **Aphrophora cribrata**, n. sp. — *Ferruginea. Vertex antice fere rotundatus, parum angulatus, in medio longior, quadruplo latior quam in medio longior, punctatus, sutura frontis et verticis carinata, nigra; fronte convexa, punctis sparsis minutis tribus in medio, et strigis minutis impressis utrinque concoloribus, instructa. Pronotum ferrugineum, crebre punctatum. Scutellum ferrugineum, punctatum, carinula lævi media. Elytra crebre punctata, minus profunde quam in pronoto, ferruginea, venis ferrugineis, hic illic pallidis.* — Long. cum elytris, 6 mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

26. **CLASTOPTERA FEMORALIS** Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 17. — Colonie Tovar, San-Esteban (3 exemplaires).

Membracides.

27. **MEMBRACIS TRIMACULATA** Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 245. — San-Esteban (1 exemplaire).

28. **MEMBRACIS TECTIGERA** Oliv., Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 246. — San-Esteban (1 exemplaire).

29. MEMBRACIS INTERMEDIA Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 249. — Coroza, Caracas (2 exemplaires).

30. ENCHENOPA NUTANS Germ., Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 252. — Valencia (4 exemplaires).

31. ENCHENOPA MONOCEROS Germ., Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 253. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

32. BOLBONOTA PICTIPENNIS Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 258. — Caracas (1 exemplaire).

33. SPHONGOPHORUS BALLISTA Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 535. — San-Esteban (1 exemplaire).

34. SPHONGOPHORUS BENNETI Kirby, *Mag. Nat. Hist. Lond.*, p. 20. — San-Esteban (1 exemplaire).

35. PTERYGIA SATANAS Lesser. Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 264. — San-Esteban (1 exemplaire).

36. PTERYGIA CRASSICORNIS Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 264. Puerto-Cabello (1 exemplaire).

37. TRIQUETRA VIRESCENS Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 281. — Colonie Tovar, San-Esteban (6 exemplaires).

38. CERESA VITULUS Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 540. — Caracas (2 exemplaires).

39. CERESA DISCOLOR Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 286. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

40. CENTROGONIA FLACCIDA Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 288. — Colonie Tovar (2 exemplaires).

41. ACONOPHORA PUGIONATA Germ., *Rev. Silberm.*, 3, p. 238. — Colonie Tovar (17 exemplaires).

42. ENTYLIA GEMMATA Germ., *Rev. Silberm.*, 3, p. 248. — Caracas, Colonie Tovar (5 exemplaires).¹

43. THELIA CITRINA? Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 309. — Coroza, Caracas (3 exemplaires).

44. DARNOIDES LIMBATA Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 495. — Colonie Tovar (2 exemplaires).

45. *PARMULA BISTRIGATA* Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 491. — Puerto-Cabello, Valencia, San-Esteban (4 exemplaires).

46. *ACUTALIS TRIPUNCTATA* Fair., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 497. — Caracas (2 exemplaires).

47. *ACUTALIS BINARIA* Fairm., *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1846, p. 497. — Caracas (1 exemplaire).

48. ***Acutalis flaviventris***, n. sp. — *Nigra, nitida, humeris apiceque thoracis pallidis; abdomine toto flavo; elytris hyalinis, decoloribus, venis brunneo-ferrugineis; femoribus nigris, tibiis et tarsis testaceis, horum incisuris articulorum nigris.* — Long. 2 mill. — Caracas (1 exemplaire).

49. ***Acutalis retrofasciata***, n. sp. — *Nigra, opaca, punctata, fascia transversa arcuata ante apicem thoracis alba; abdomine flavo; elytris flavo-pellucidis, venis concoloribus; pedibus nigris.* — Long. 2 mill. — *A. flaviventri magnitudine et colore abdominis similis; magis profunde et dense punctata; minus nitida, fere opaca; colore pedum et elytrorum, necnon fascia subapicali thoracis distincta.* — San-Esteban (1 exemplaire).

50. *ACUTALIS MODESTA* Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 32. — Caracas (2 exemplaires).

51. ***Heteronotus trinodosus***, n. sp. — *Brunneo-piceus: thorace elytris longitudine æquali, cornuto, trinodoso, primo nodo lato, secundo globoso minore, tertio globoso secundo majore, apice bispinoso (infra spina valida inter secundum et tertium nodum surgit); fronte et vertice nitidis, lævibus, brunneis, lineis parvis pallidis; thorace punctato, in parte antica opaco, cornubus acutis rectis in disco antico ad radicem alarum armato, parce pubescente, ferrugineo, carinula media longitudinali, antice alba, postice concolori, percurrente, usque ad secundum nodum continuata, lineaque media transversa primi nodi, in medio interrupta, flava; secundo et tertio nodo variolosis, sat nitidis; hujus spinis apicalibus flavis. Elytra hyalina, venis flavis; corpore lurido, pedibus testaceis, tibiis anticis non dilatatis.* ♂. — Long. 9 mill. — Corozal (1 exemplaire).

52. *CYPHONIA CLAVATA* Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 548. — La Guaira (1 exemplaire).

53. **Cyphonia furcispina**, n. sp. — *Nigra, nitida, lævigata, pilis longis nigris remote hirta; lobo medio capitis genisque, thoracis maculis duabus anticis pone oculos, maculis duabus utrinque mox pone spinas anticis, aliaque oblonga inter spinas, tibiis, excepto apice, et tarsis flavescens; abdomine testaceo, segmentis apice nigro marginatis. Thorax spinis anticis dichotomis; spinis posticis lateralibus ad medium crassis, pyriformibus, a medio subito gracilibus, spina media gracili, longiore, in medio arcuata, postice ferruginea. Elytra hyalina, flavo tincta, basi nigra, venis ferrugineis.* ♀. — Long. 5 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

Cette espèce est voisine de *C. NASALIS* Stål.

54. **TOLANIA FRATERNA** Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 37. — San-Esteban (1 exemplaire).

55. **Tolania cristata**, n. sp. — *Pallide olivaceo-flavescens, punctata; thorace cristulis duabus discoidalibus, parum productis, carinula media percurrente, instructo; scutellum pallidum, basi turgidum. Elytra flavo-hyalina, basi coriacea, punctata, ferruginea; venis flavis.* ♂, *pectore et femoribus nigris; ♀, flavescens.* — Long. 7 mill. — Colonie Tovar, La Guaira, Caracas (5 exemplaires).

Cette espèce est voisine de *T. FRATERNA* Stål.

56. **Nicomia inermis**, n. sp. — *Ferruginea, punctata, thoracis vittis duabus longitudinalibus latis fuscis; elytris hyalinis, basi ferrugineis et punctatis, coriaceis; venis testaceis, maculaque discoidali antica utrinque, alteraque suturali pone apicem clavi, fuscis; corpore et pedibus obscuris, genibus flavis.* ♂. — Long. 6 mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

57. **Nicomia retrospinosa**, n. sp. — *Testacea, capite et pectore nigris, flavo-pubescentibus; thorace testaceo, pube aurata tecto, antice pone oculos utrinque macula nigra ornato, in medio carina longitudinali postice in spinam gracilem, curvatam, usque ad apicem scutelli productam, armato: elytris hyalinis, parce pubescentibus, basi coriaceis et punctatis; venis flavis, apicalibus fuscis: abdomine et pedibus flavis.* ♂. — Long. 3 1/2 mill. — Caracas (1 exemplaire).

58. **ÆTHALION PARVICEPS** Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1851, p. 671. — San-Esteban (2 exemplaires).

59. *ÆTHALION RETICULATUM* Linn., Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1851, p. 676. — Colonie Tovar, Caracas (8 exemplaires).

Jassides.

60. *Macropsis pubipennis*, n. sp. — *Parva, ferruginea, abdomine lateribus et subtus aurantiaco, dorso medio nigro; pedibus aurantiacis. Caput nigrum, obselete rufo-limbatum, latum, pronoto tamen paulo angustius. Pronotum ferrugineum, strigis minimis transversis impressis dense instructum. Scutellum magnum, pronoti longitudini æquale, triangulare, longitudine latius, strigis minimis transversis impressis instructum. Elytra flavo-pallida, clavo sat crebre punctato, pilisque pallidis sat crebre oblecto; corio subpellucido, venis parum distinctis, remote punctato et piloso; apice clavi anguste nigro marginato.* — Long. 3 mill. — Caracas (1 exemplaire).

61. *Agallia major*, n. sp. — *Albo-grisea. Vertex cum oculis thorace latior, longitudine fere nullus, albo-griseus, in sutura frontis punctis tribus nigris ornatus. Frons albo-grisea, in medio sulco impresso transverso arcuato, lineaque longitudinali media nigra a sulco ad suturam verticis ducta, instructa; parte inferiore frontis prope genas utrinque parce nigro maculata. Pronotum albo-griseum, maculis duabus subbasalibus, lineaque longitudinali media, nigris. Scutellum griseum, utrinque nigro-maculatum. Elytra grisea, venis validis albis, sutura late fusca, colore fusco venis pallidis interrupto; in medio corii fascia transversa undata nigra venis interrupta. Pedes pallidi, tibiis posticis extus nigro-maculatis. ♂.* — Long. 5 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

Statura magna in hoc genere insignis.

62. *AGALLIA SINUATA* Muls. et Rey. — Caracas (1 exemplaire).

Je n'ai pas pu voir de différence appréciable entre cet insecte et *A. sinuata* d'Europe.

63. *TETTIGONIA FASTUOSA* Fabr., *Syst. Rhyngot*, p. 70. — Caracas (2 exemplaires).

64. *TETTIGONIA CRASSA* Walker, *List of Homopt.*, p. 762. — Colonie Tovar (7 exemplaires).

65. *TETTIGONIA QUADRIGUTTATA* Fabr., *Syst. Rhyngot*, p. 77. — Caracas (2 exemplaires).

66. *TETTIGONIA QUADRIPLAGIATA* Walker, *List of Homopt.*, p. 774. — Caracas (2 exemplaires).

67. *TETTIGONIA PROXIMA* Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1853, p. 361. — San-Esteban, Puerto-Cabello (8 exemplaires).

68. *TETTIGONIA CHEVROLATI* Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1855, p. 778, Variété. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

69. *TETTIGONIA RUFA* Walker, *List of Homopt.*, p. 742. — Colonie Tovar (3 exemplaires).

70. *TETTIGONIA SCITA* Walker, *List of Homopt.*, p. 753. — Caracas (4 exemplaires).

71. *TETTIGONIA AMÆNA* Walker, *List of Homopt.*, p. 759. — San-Esteban, Colonie Tovar, Caracas (7 exemplaires).

72. *TETTIGONIA BIFIDA* Say, *Journ. Ac. Nat. sc. Phil.*, 6, p. 313. — Caracas (1 exemplaire).

73. *Tettigonia atrovirens*, n. sp. — *Nigra ; vertice rotundato, flavo, fascia basali in medio interrupta et valde sinuata, fasciaque antica, nigris, ornato ; fronte flava, in medio linea gracillima nigra, strigisque minutis brevibus fuscis utrinque ornata. Pronotum nigro-viride, antice nigrum, basi anguste flavo-marginatum, lateribus macula transversa flava ornatum. Scutellum nigrum, linea gracili lateribus utrinque limbatum ; elytris viridibus, vitta longitudinali percurrente ad suturam internam clavi, sutura clavi et corii, necnon vitta longitudinali submarginali et membrana, nigris ; pectore et abdomine nigris, incisuris pectoris et margine postico segmentorum abdominis albis ; pedibus pallidis, tibiis et tarsis posticis nigris. ♀. — Long. 5 mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire).*

Cette espèce est voisine de *T. BIFIDA* Say.

74. *TETTIGONIA VARIABILIS* Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1854, p. 14. — San-Esteban (1 exemplaire).

75. *TETTIGONIA SOBRINA* Stål, *Bidr. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 41. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

76. *TETTIGONIA OBSOLETA* Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1854, p. 15. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

77. **Tettigonia novemnotata**, n. sp. — *Flava; capite, thorace et scutello nigro-maculatis. Vertex antice rotundatus, flavus, duabus lineis transversis nigris anticis ornatus; fronte flava, puncto rotundato nigro in sutura frontis et verticis. Thorax flavus, puncto minimo in medio marginis antici, punctisque tribus majoribus disci, uno medio, duobus submarginalibus, nigris. Scutellum flavum, angulis lateralibus sat late nigris. Elytra testacea, nitida. Dorsum abdominis nigrum, flavo-marginatum: corpore subtus et pedibus pallidis. ♂, scutello apice nigro; ♀, apice concolore.* — Long. 8 mill.; cum elytris, 9 mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

Cette espèce est voisine de **T. FERRUGINEA** Fabr.

78. **TETTIGONIA HERBIDA** Walker, *List of Homopt.*, p. 769. — San-Esteban (1 exemplaire).

79. **TETTIGONIA LINEATA** Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1854, p. 21. — Caracas, San-Esteban (2 exemplaires).

80. **TETTIGONIA FLAVOVITTATA** Stål, *Bird. Rio Janeiro Trakt.*, 2, p. 42. — Caracas (1 exemplaire).

81. **TETTIGONIA MARGINELLA** Fabr., *Syst. Rhyngot.*, p. 68. — San-Esteban (1 exemplaire).

82. **TETTIGONIA CYANESCENS** Walker, *List of Homopt.*, p. 760. — Caracas (1 exemplaire).

83. **TETTIGONIA VARIEGATA** Fabr., *Syst. Rhyngot.*, p. 67. — Caracas (1 exemplaire).

84. **Tettigonia inflatoseta**, n. sp. — *Nigra, pedibus et vitta basali et suturali clavi læte flavis. Vertex niger, $\frac{1}{3}$ longior quam latior, pronoto longitudine æqualis, antice obtusus; fronte nigra. Antennæ flavæ, seto terminali flavo, hoc ante apicem in globulum minutissimum sed distinctum, ovatum, nigrum, dilatato; scutellum et elytra nigra, clavi basi et sutura læte et distincte flavis; subtus nigra, pedibus flavis. ♀.* — Long. 4 $\frac{1}{2}$ mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

T. VARIEGATÆ Fabr. *affinis: globulo seti antennalis et colore insignis.*

85. **TETTIGONIA OBTECTA** Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1855, p. 798. — San-Esteban (5 exemplaires).

86. PROCONIA MARGINATA Walker, *List of Homopt.*, p. 785. — Caracas, San-Steban (7 exemplaires).

87. PROCONIA OBTUSA Fabr., *Syst. Rhyngot.*, p. 62. — Caracas, San-Esteban (3 exemplaires).

88. PROCONIA ATRA Walker, *List of Homopt.*, p. 789. — Coroza, San-Esteban, Colonie Tovar (6 exemplaires).

89. PROCONIA ICHTHYOCEPHALA Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1854, p. 494. — Caracas (2 exemplaires).

90. PROCONIA QUADRIMACULATA Walker, *List of Homopt.*, p. 743. — Coroza (1 exemplaire).

91. PROCONIA LABOULBENI Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1855, p. 52. — Caracas (2 exemplaires).

92. PROCONIA DUFOURI Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1855, p. 55. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

93. PROCONIA SULCATA Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1855, p. 58. — Caracas (1 exemplaire).

94. PROCONIA SPARSUTA Signoret, *Ann. Soc. ent. de Fr.*, 1855, p. 508. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

95. CICCUS BREVIS Walker, *List of Homopt.*, p. 807. — Colonie Tovar (3 exemplaires).

96. GYPONA PULCHRA Spangberg., *Spec. Gypon*, 1878, p. 32. — San-Esteban (1 exemplaire).

97. GYPONA VITICOLLIS Spangberg., *Spec. Gypon*, 1878, p. 33. — San-Esteban, Colonie Tovar, Caracas (3 exemplaires).

98. GYPONA MARMORATA Spangberg., *Spec. Gypon*, p. 59. — San-Esteban (1 exemplaire).

99. GYPONA PUNCTATA Spangberg., *Spec. Gypon*, p. 67. — San-Esteban (1 exemplaire).

100. CÆLIDIA MÆSTA Spangberg., *Spec. Jassid.*, 1878, p. 8. — San-Esteban (1 exemplaire).

101. CÆLIDIA TRUNCATA Spangberg., *Spec. Jassid.*, 1878, p. 9. — San-Esteban (1 exemplaire).

102. *Thamnotettix alterninervis*, n. sp. — *Flavus, albo, roseo et fusco variegatus. Vertex antice subangulatus, in medio paulo longior quam ad latera, $\frac{1}{3}$ longior ac latior, basi valde emarginatus et arcuatus, roseo, nigro et pallido variegatus, ante apicem linea distinctiore nigra transversa ornatus, apice ipso pallido; fronte et clypeo pallidis, immaculatis. Pronotum antice productum, subrotundatum, basi subtruncatum, roseum, pallido conspersum. Scutellum nigrum, triangulare, pallidum, angulis lateralibus late roseis. Elytra magna, abdomen valde superantia, valvantia, testacea; venis validis, maculis alternis nigris et albis instructis; apice infumato; corpore et pedibus flavis, incisuris spinularum tibiarum posticarum nigris.* ♂. — Long. 5 mill.; cum elytris, 7 mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

