

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE
DE CERCOPIDE CONSTITUANT UN NOUVEAU GENRE

[HEMPT. HOM.]

par le Dr LALLEMAND.

Pachypterinella, n. g.

Front globuleux, à stries transversales latérales et à carène médiane mousse; vertex plus court que large entre les yeux, à carène mousse, peu marquée, à surface grossièrement ponctuée, ocelles plus près l'un de l'autre que des yeux, près du bord postérieur au milieu de la distance séparant les yeux des ocelles une fossette relativement assez grande; pronotum, à surface assez aplatie, grossièrement ponctuée, à carène médiane surtout marquée sur la moitié postérieure, bord antérieur droit, bords antéro-latéraux un peu convexes, bord postérieur, fort concave; écusson assez grand, plus long que large à pointe effilée, à fossette centrale, à surface irrégulièrement ponctuée et striée en avant, transversalement striée en arrière; élytres épais, assez coriaces, densément ponctués, à nervures nettes, cubitus et médian réunis par un rameau transverse; rostre court, s'étendant seulement jusqu'entre les hanches médianes; 2 fortes épines sur les tibias postérieurs.

La forme de cet Homoptère rappelle celle d'un Ténébrionide, par la ponctuation et la forme du vertex, du pronotum et des élytres et est facilement reconnaissable.

Type : *Pachypterinella fusca* Lallemand.

Pachypterinella fusca, n. sp.

La coloration générale est brun foncé; hanches et base des ailes ocre; ailes légèrement enfumées, segments abdominaux finement bordés d'ocre brun en arrière et sur les côtés.

Longueur : 13,5 à 14 mm.

Habitat : Brésil, San Catharina.

Type : collection du Muséum de Paris et la mienne.