

DIAGNOSES
DE CERCOPIDES AFRICAINS NOUVEAUX

par **V. Lallemand.**

Je donne ici la diagnose rapide de quelques Cercopides africains faisant partie de la collection de mon collègue et ami M. SCHOUTEDEN, et de la mienne propre, et dont je compte faire une étude plus détaillée dans un travail d'ensemble sur les Cercopides africains que je publierai plus tard.

1. — TOMASPIS NOTATA n. sp.

Brun. Vertex un peu plus foncé. Pronotum plus clair avec une légère teinte rougeâtre; élytres brunes avec trois taches jaunes arrondies, deux antérieures tout près de la suture du clavus et vers son milieu, se touchant légèrement l'une l'autre, la dernière vers le tiers postérieur de l'élytre, à égale distance des bords interne et externe. — Long. 14 1/2 mill.

Congo français : Lambarem (Collection SCHOUTEDEN.)

2. — TOMASPIS SCHOUTEDENI n. sp.

Entièrement rouge brun, sauf la bordure des élytres qui est noire; pronotum plus foncé, très brillant, ailes hyalines; pattes antérieures et médianes rouge noir; cuisses des pattes postérieures rouge clair, leurs tibias et tarses d'un rouge noir. — Long. 13 1/2 mill.

Madagascar (Collection SCHOUTEDEN.)

3. — TOMASPIS WELLMANI (SCHOUTEDEN in litteris).

Ressemble au *Tomaspis Haglundi* SCHOUT.

Noir brun. Yeux et front noirs; élytres noires, luisantes, avec deux raies jaunâtres translucides longitudinales, l'une occupant le clavus, l'autre de toute la longueur du corium. Dos brun clair, ailes noirâtres translucides. — Long. 14 mill.

Benguela (Collection SCHOUTEDEN.)

4. — TOMASPIS TRICOLOR (var. du précédent?).

Noire. Pattes rougeâtres; dos rouge; la raie longitudinale du corium rougeâtre; ailes noirâtres translucides. — Long. 14 mill.

Congo (Collection SCHOUTEDEN.)

5. *LOCRIS RUBRA* var. *PULCHRA* n. var.

Base et carène située sur le milieu du front, lobes du vertex, bords antérieurs, latéraux et postérieurs du thorax rouge cinnabre; scutellum, tête entre les yeux et tache au milieu du thorax noirs; élytres rouges, devenant progressivement lie de vin vers l'extrémité.

Ressemble beaucoup à la var. *intermedia* SCHOUT., en diffère par le scutellum noir. — Long. 13 mill.

Delagoa Bay : Sikumba (Collection SCHOUTEDEN.)

6. — *LOCRIS RUBRA* var. *LUTEA* n. var.

Ressemble à la var. *intermedia* SCHOUT. mais la base et la carène du milieu du front, le thorax, sauf la tache noire médiane et le scutellum jaunâtre; les segments de l'abdomen sont bordés de jaune en arrière; tibias jaunâtres. — Long. 12 1/2 mill.

Uganda (Collection SCHOUTEDEN.)

7. — *LOCRIS ETHIOPICA* var. *TRIPUNCTATA* var. n.

Cette variété diffère de l'espèce type par les élytres qui n'ont que trois taches au lieu de sept situées sur le corium, une parallèlement au milieu de la suture séparant le corium et le clavus, une au bord interne de l'aile à la pointe du clavus et une au bord externe. — Long. 13 mill.

Rhodésie (Collection SCHOUTEDEN.)

8. — *LOCRIS UNDATA* n. sp.

Tête rougeâtre avec la partie entre les yeux noire; thorax noir avec le bord antérieur, les bords latéraux et une ligne médiane transversale rouge; scutellum noir. Elytres rouges, chiffonnées, à nervures assez marquées. Corps noir avec les attaches des pattes rouges, pattes antérieures et moyennes rouges, pattes postérieures ayant les cuisses noires, tibias rouges, les tarses noirs, organes génitaux rouges, ailes translucides noirâtres. — Long. 11 mill.

Erythrée : Ghindah (Collection SCHOUTEDEN.)

9. — *LOCRIS JOHANNÆ* n. sp.

Entièrement rouge carmin de forme assez allongée. Elytres à nervures fort marquées, surtout à la partie postérieure. Yeux noirs,

pronotum ponctué avec de grosses dépressions à la partie antérieure et de chaque côté. — Long. 13 mill.

Lac Tanganyka, rive occidentale Sud (Ma collection.)

Var. NIGROLIMBATA (n. var).

Extrémité des élytres noire; avec les dépressions du pronotum teintées de noir. — Long. 13-13 1/2 mill.

Madagascar.

10. — LOCRIS GODINGI n. sp.

Tête, vertex, pronotum noirs; élytres rouges lie de vin, dessous du thorax rouge clair, abdomen rouge plus foncé, pattes antérieures et extrémité des pattes postérieures rouge très foncé, le reste des pattes rouge clair.

Cette espèce est la plus petite des *Locris* que je connaisse. — Long. 8 mill.

Kamerun : Bipindi (Collection SCHOUTEDEN.)

11. — LOCRIS VANDUZEEI n. sp.

Rougeâtre. Tête rouge, yeux rouge noirs, dessous du corps rouge avec une tache noire de chaque côté au niveau des pattes antérieures, cuisses postérieures d'un rouge plus clair, pronotum rugueux noir légèrement teinté de rougeâtre, avec une bande rouge au bord postérieur; scutellum noir rougeâtre, élytre brun grenat avec veines rouge jaunâtre, limbe apical noirâtre entre les veines rouges et non jaunâtres. Ressemble au *Locris kambovensis* DIST. et au *Locris tricolor* SCHOUT. — Long. 11 mill.

Congo : Lomami (Ma collection.)

12. — CLOVIA SCHOUTEDENI n. sp.

Noir. Lignes et taches longitudinales et obliques jaunes nombreuses, tête noire. 5 lignes partent du bord antérieur du front, une médiane se continuant sur le bord interne des élytres, une externe se continuant à travers le clavus et le corium et se terminant en s'élargissant vers le milieu du bord externe et formant dans son ensemble un angle obtu. Entre les deux précédentes une troisième

se continuant également sur les élytres et formant un angle arrondi ouvert vers le haut sur la partie postérieure des élytres, deux lignes jaunes, une plus large antérieure formant en quelque sorte un V avec la ligne externe. Dessous du corps brun noir avec deux lignes jaunes s'étendant du front sur les joues. — Long. 8 mill.

Nigérie : Abutschí (Collection SCHOUTEDEN.)
