

HOMOPTÈRES NOUVEAUX
DE LA COLLECTION DU MUSÉUM NATIONAL DE PARIS ET DE LA MIENNE,

PAR M. LE D^r V. LALLEMAND.

(Mars 1924.)

(Suite.)

TRIBU : TOMASPISINI.

19. *Tomaspis bipunctata* nov. sp.

Noire; rostre et pattes ocre jaune, sauf les tibias antérieurs et médians, les tarses et les épines des pattes postérieures, qui sont bruns; une bande transversale blanc grisâtre sur le tiers antérieur du pronotum et deux taches plus ou moins ovales de même couleur sur les élytres: la première occupant la base du clavus et débordant très légèrement sur le corium; la seconde située au milieu de l'élytre, au niveau de l'extrémité du second tiers de la longueur.

Rostre s'étendant jusqu'à l'extrémité des hanches médianes; deux épines sur les tibias postérieurs. Front bombé, lisse, à stries transversales, à peine indiquées, sans carène longitudinale.

Longueur totale: 8,5 millimètres.

Longueur des élytres: 7 millim.; largeur des élytres: 2,5 millim.

Habitat: Colombie.

Type: Collection du Muséum National de Paris et la mienne.

20. *Tomaspis Seguyi* nov. sp.

Tête noire, sauf le rostre et les lobes latéraux du vertex (de chaque côté de la partie frontale), brun clair; pronotum brillant brun clair, bordé antérieurement d'une assez large bande ocre-jaune; écusson ocre jaune, sauf l'extrémité brune; élytres brun plus foncé à la partie postérieure, base du clavus (environ le 1/5 de la longueur); partant de celui-ci, une fine bande longeant la suture clavo-coriale et deux taches: longitudinales, l'une derrière l'autre, sur la moitié postérieure du corium ocre jaune; la deuxième tache, dont l'extrémité est voisine du bord postérieur de l'élytre est plus

20

foncée que la première et par conséquent se remarque moins vite; ailes enfumées, à base ocre jaune; sternum, pattes ocre jauné légèrement brunâtre; extrémités des épines et des griffes noires; abdomen brun, bord postérieur de chacun des segments ocre jaune brunâtre. Élytres recouvertes d'une fine et dense villosité jaune brunâtre. Front sans carène longitudinale, à stries transversales à peine visibles, bombé, brillant. Bord antérieur de la tête arrondi; partie supérieure de la tête à peu près plane; rostre atteignant l'extrémité des hanches médianes; pas de carène sur le pronotum; deux épines sur les tibias postérieurs.

Espèce faisant partie du groupe *caligata* Jac., *pica* Jac., *minuscula* Jac., *chausi* Jac.

Je ne comprends pas pourquoi M. Jacobi a placé ces Insectes dans le groupe *Triecphora*, puisque leur front ne porte aucune carène; leur place est dans le groupe *Tomaspis* Am. et Serv.

Longueur totale: 8 millimètres.

Longueur des élytres: 6,5 millim.; largeur des élytres: 2 millim.

Habitat: Équateur, Ambato.

Type: ma collection.

21. *Tomaspis ravidella* nov. sp.

Abdomen, tête, extrémité des épines et des griffes des pattes postérieures noirs. Clypéus, rostre et pattes rouges; sternum, pronotum et écusson brun rouge; tarses des pattes antérieures et médians brun rouge. Élytres brun jaune à base rouge et à extrémité noire, sur le milieu du corium, au commencement du tiers apical, une tache jaune orange. Élytres et pronotum recouverts d'une villosité jaunâtre. Front sans carène longitudinale, à stries latérales légères, ayant deux petites saillies à l'endroit où il se recourbe; vu de côté, il montre un angle un peu plus grand que le droit.

Ocelles très petits, très proches, séparés par une carène longitudinale; bord antérieur de la partie frontale du vertex à peu près droit.

Rostre atteignant l'extrémité des hanches médianes; deux épines sur les tibias postérieurs.

Espèce voisine de *ravida* Jac.

Longueur totale: 9 millimètres.

Longueur des élytres: 7,5 millim.; largeur des élytres: 2,5 millim.

Habitat: Bolivie.

Type: Collection du Muséum National de Paris et la mienne.

22. *Tomaspis lunulata* nov. sp.

Ocre rouge, sauf le rostre, les pattes, le centre du prosternum, les méso- et métasternum, l'abdomen, une tache noire plus ou moins arrondie

Bull. Mus. Hist. Nat. Paris
378-385

*

sur le radius, au-devant du milieu de l'élytre, ainsi que les bords externe, postérieur et interne, jusqu'à l'extrémité du clavus, noirs: la bordure noire commence finement au niveau de la tache coriale, un millimètre et demi plus loin s'élargit brusquement et est le plus large au niveau de l'extrémité du clavus. Yeux gris. Ailes légèrement enfumées. Tête relativement assez longue, front sans carène longitudinale, à stries transversales latérales légères, à partie médiane lisse, brillante, très légèrement déprimée: vu de côté, la ligne qu'il dessine n'est pas fortement convexe; deux fortes épines, plus rapprochées que d'habitude, sur les tibias postérieurs. Élytres recouverts d'une villosité orange.

Insecte probablement voisin de *T. apicalis* Lep. et Serv.

Longueur totale: 18 millimètres.

Longueur des élytres: 15 millim.; largeur des élytres: 5 millim.

Habitat: Guyane française, Cayenne. (Le Moult.)

Type: ma collection.

23. *Monecphora fluvialis* nov. sp.

Front arrondi à carène médiane et sillons transverses latéraux bien marqués. Vu de côté, il montre une ligne arrondie; une fine carène sur le pronotum continuant celle du vertex; deux épines sur les tibias postérieurs.

Noire, sauf cinq taches sur les élytres, la base de l'aile, les bords latéraux et postérieurs des segments abdominaux, qui sont rouges; base de l'abdomen et tarière de la ♀ ocre jaune rosé. Les taches des élytres sont ainsi disposées: la première, au bord externe, à la fin du tiers antérieur; la seconde, un peu en arrière de la séparation des nervures médiane et cubitale; la troisième, sur le milieu du clavus, au niveau de la première; la quatrième, au bord externe, au commencement du tiers postérieur; et la cinquième, au même niveau, près de la pointe du clavus, sur la nervure cubitale; les deux taches du bord externe sont les plus grandes; la tache du clavus est souvent évanescence. Cette espèce est d'ailleurs fort variable.

Longueur totale: 15 millimètres.

Longueur des élytres: 13 millim.; largeur des élytres: 4 millim.

Habitat: République Argentine, Chaco de Santa-Fé, bords du Las Garzas, à 20 kilomètres à l'ouest d'Ocampo, 1903. (Wagner.)

Type: Collection du Muséum National de Paris et la mienne.

Var. *lateralis*: il ne reste plus que les deux taches du bord externe du corium; bords postérieurs des segments abdominaux noirs.

Habitat: Brésil, Porto-Alegre.

Type: ma collection.

Var. *bipunctata*: les deux tiers antérieurs des élytres, ainsi que les deux taches du tiers postérieur, rouges. Bordure rouge des segments abdominaux plus large; le dernier segment au devant des organes génitaux est tout rouge à sa partie médiane.

Habitat: République Argentine, Chaco de Santa-Fé. (Wagner et Le Moult.)

Type: Collection du Muséum National de Paris et la mienne.

24. *Monecphora Moreira* nov. sp.

Tête, pronotum, écusson, élytres, pro- et mésosternum, abdomen, extrémité des tarsi et des épines, noirs; pattes, mésosternum, rostre (sauf son extrémité brun-rouge), une fine ligne au milieu du bord postérieur des segments abdominaux, milieu du dernier segment, extrême base des élytres et des ailes rouge-carmin: deux bandes transversales sur les élytres, ainsi que la tarière des ♀ jaune rougeâtre; la première bande est transversale, la seconde est oblique en dedans et en arrière et aboutit à l'extrémité du clavus; bandes recouvertes d'une villosité jaune et le reste d'une villosité brune.

Front globuleux à carène nette et à stries transversales bien marquées. Vu de côté, il montre une ligne arrondie.

Ocelles très proches, séparés par une fine carène; pas de carène sur le pronotum, qui est assez grossièrement ponctué en stries transversales. Deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 11 millimètres.

Longueur des élytres: 9 millim.; largeur des élytres: 3 millim.

Habitat: Brésil.

Type: Collection du Musée de Rio de Janeiro, du Muséum National de Paris et la mienne.

Je dédie cette espèce à M. Moreira, directeur du Musée de Rio de Janeiro, qui m'a envoyé plusieurs exemplaires de cette espèce.

25. *Monecphora Ferranti* nov. sp.

Tête, toutes les cuisses, prosternum ocre jaune légèrement teinté de rouge; métasternum, tibias postérieurs, abdomen ocre jaune légèrement teinté de brun; organes génitaux brun jaunâtre; pronotum, pointe de l'écusson, deux bandes sur les élytres ocre jaune, le bord postérieur de la 1^{re} bande est situé à peu près au niveau de l'extrémité du premier tiers de la longueur et la seconde se trouve au devant de la partie apicale réticulée. Sont noirs: les élytres, les ocelles, les antennes, des taches sur les yeux,

le rostre, le mésosternum, les tibias antérieurs et médians, les épines et tous les tarses.

Ailes enfumées spécialement vers l'extrémité, à base jaunâtre.

Sur le front, une carène nette et des stries transversales bien marquées, relativement assez aplati sur les bords. Vu de côté, il montre une ligne courbe. Sur les tibias postérieurs deux épines, dont une très petite près de la base et l'autre plus grande près de l'extrémité.

Longueur totale : 11 millimètres.

Longueur des élytres : 9,5 millim.; largeur des élytres : 2 millim.

Habitat : Brésil, Bahia.

Type : ma collection.

Je dédie cette espèce à M. Ferrant, conservateur du Musée d'histoire naturelle de Luxembourg.

26. *Monecphora pallida* nov. sp.

Ocre jaune pâle; ocelles, antennes, second article du rostre, tarses antérieurs et médians, extrémités des épines et des tarses des pattes postérieures noirs; yeux bruns; abdomen légèrement brunâtre; entre les angles latéraux du pronotum, une ligne transversale brun très clair; élytres opaques à leur base, devenant ensuite transparentes, recouvertes, ainsi que le pronotum, par une villosité jaune d'or. Ailes légèrement enfumées; front à carène obtuse peu saillante et à stries transversales bien marquées. Vu de côté, il montre une ligne légèrement convexe. Ocelles proches l'un de l'autre, séparés par une carène longitudinale; pronotum finement ponctué, lisse et brillant, sans carène longitudinale; deux fortes épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 13,5 millimètres.

Longueur des élytres : 11,5 millim.; largeur des élytres : 3,5 millim.

Habitat : Guyane, Saint-Laurent de Maroni. (Le Moul.)

Type : ma collection.

27. *Monecphora decorata* nov. sp.

Tête orange, plus foncée sur le vertex, spécialement sur les côtés: prosternum orange brun sur les côtés, mésosternum noir sur le milieu, brun sur les côtés; mélasternum ocre jaune; rostre brun noir; cuisses orange légèrement rougeâtre, tibias et tarses antérieurs et médians bruns, les postérieurs jaune brun; abdomen jaune brun clair, ayant une légère teinte rougeâtre; organes génitaux bruns; pronotum brun rougeâtre; écusson noir; élytres plus ou moins transparents, brun noir, traversés par deux bandes rouges à la fin du 1^{er} tiers et l'autre devant la partie

apicale réticulée et recouverts d'une villosité jaune sur les bandes rouges et brune sur le restant. Ailes enfumées à base rosée; sur le front, une carène nette et des stries transversales bien marquées. Vu de côté, il montre une ligne convexe, arrondie; bord antérieur du vertex en angle aigu; ocelles plus proches l'un de l'autre que des yeux, situés de chaque côté de l'élévation médiane du vertex. Pronotum finement ponctué, lisse et brillant, sans carène médiane. 2 épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 10 millimètres.

Longueur des élytres : 8,5 millim.; largeur des élytres : 3 millim.

Habitat : Brésil, Bahia.

Type : ma collection.

28. *Monecphora cœrulea* nov. sp.

Tête, prosternum, pronotum, écusson noir bleuâtre; élytres nettement noir bleuâtre sur la moitié antérieure devenant progressivement plus brun foncé et plus ou moins transparents à la partie apicale. Face supérieure de l'insecte recouverte d'une villosité grise. Ailes enfumées, légèrement rouges à leur base. Méso- et mélasternum, tibias et tarses postérieurs, base de l'abdomen et une fine bordure postérieure; base de l'abdomen et une fine bordure postérieure sur chacun de ses segments ainsi que le dernier segment rouges; pattes antérieures et médianes rouge brunâtre; extrémités des épines et des griffes des pattes postérieures noires.

Front globuleux; sur celui-ci, une fine carène longitudinale et des stries transversales. Vu de côté, il montre une ligne courbe arrondie. Ocelles de grosseur moyenne séparés par une carène longitudinale, plus près l'un de l'autre que des yeux.

2 fortes épines sur les tibias postérieurs, une près de la base et l'autre non loin de l'extrémité; pronotum rugueux, montrant une carène bien nette sur les trois quarts postérieurs; 3 fossettes sur l'écusson: deux petites de chaque côté du bord antérieur et une très grande occupant presque tout le disque.

Longueur totale : 10 millimètres.

Longueur des élytres : 9 millim.; largeur des élytres : 3 millim.

Habitat : Brésil, État de Sao Paulo. (Le Moul.)

Type : ma collection.

29. *Monecphora fortunata* nov. sp.

Partie supérieure de la tête brune; front ocre jaune brunâtre, à carène médiane brune. Sternum, abdomen et pattes ocre jauné plus ou moins teinté de brun; extrémité des tarses et des épines noire; pronotum brun

noir devenant brun clair en avant, le long des bords antérieurs et latéro-antérieurs; écusson noir, brun clair le long des bords latéraux et à la pointe. Élytres brun noir; sur ceux-ci, une bande longitudinale externe au radius, atteignant le bord externe à sa base et à son extrémité et occupant les deux tiers de la longueur de l'élytre; une seconde bande longitudinale sur le clavus, comprise entre la nervure anale externe et le bord interne; enfin trois fines bandes occupant les nervures cubitale et médiane après leur séparation, la branche interne du radius et leurs bifurcations jaunes.

Ailes enfumées, foncées, jaunâtres à la base.

Front ayant une ligne carène longitudinale et des stries transversales. Vu de côté, il est arrondi.

Ocelles petits, très proches l'un de l'autre.

Longueur totale : 10 millimètres.

Longueur des élytres : 8,5 millim.; largeur des élytres : 2,5 millim.

Habitat : Brésil, Rio-Verde, Goyaz.

Type : Collection du Muséum National de Paris et la mienne.

30. *Monecphora longitudinalis* nov. sp.

Tête d'un rouge légèrement brunâtre, tachetée de brun foncé au bord postérieur du vertex et sur le front. Yeux noirs. Rostre noir rougeâtre; sternum, abdomen rouge teinté de brun; cuisses, tibias médians rouge; tibias antérieurs rouge brun; tarsi et épines noirs; les tibias postérieurs, sur le type, sont l'un brun rougeâtre et l'autre noir.

Pronotum ocre jaune pâle, sur le milieu, entre les angles latéraux, mais ne les atteignant pas; une ligne noire transversale; écusson noir; élytres ocre jaune pâle; sur ceux-ci, une assez large bande noire partant, de la base, longeant les bords externe postérieur et interne jusque l'extrémité du clavus où elle suit la suture clavo-coriale jusqu'à la base; sont donc ocre jaune la partie médiane du corium formant une bande longitudinale et la presque totalité du clavus. Ailes enfumées, rouges à la base. L'insecte est recouvert d'une villosité jaune. Sur le front, une carène longitudinale médiane peu saillante et des stries transversales peu nettes. Vu de côté, il ne dessine pas d'angle, mais montre une ligne arrondie, convexe. Ocelles relativement assez gros très près l'un de l'autre, séparés par une carène longitudinale; deux très fortes épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 13 millimètres.

Longueur des élytres : 11 millim.; largeur des élytres : 3,5 millim.

Habitat : Cayenne (Le Mout).

Type : ma collection.

31. *Monecphora carbonaria* nov. sp.

Entièrement noir charbon; sur le vertex, le pronotum et l'écusson une teinte bleu verdâtre métallique; yeux gris; bords postérieurs des segments abdominaux brun rouge.

Sur le front une carène longitudinale nette et de légères stries transversales, latérales; partie médiane lisse et brillante; vu de côté, il ne montre pas d'angle, la carène frontale se continuant sur le vertex; ocelles très proches l'un de l'autre.

Pronotum grossièrement ponctué en stries transversales; sur ses trois quarts postérieurs, une carène longitudinale; sur l'écusson, 3 fossettes, deux petites de chaque côté du bord antérieur et une grande occupant tout le disque.

Rostre s'étendant jusqu'à la base des hanches postérieures; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 10,5 millimètres.

Longueur des élytres : 8,5 millim.; largeur des élytres : 3 millim.

Habitat : Colombie.

Type : Collection du Muséum National de Paris et la mienne.

(A suivre.)