

*HOMOPTÈRES NOUVEAUX*  
DE LA COLLECTION DU MUSÉUM NATIONAL DE PARIS ET DE LA MIENNE,

PAR M. LE D<sup>r</sup> V. LALLEMAND.

(Mars 1924.)

(Fin.)

32. *Sphenorhina peruana* nov. sp.

♀. Noire, tête (sauf les yeux, les antennes, l'extrémité du clypeus), écusson, une tache triangulaire au milieu du bord antérieur du pronotum, rouge carmin; sur les élytres, une bande et une tache jaune, la bande est oblique en dedans et en avant et voisine de la base, part de l'extrémité du tiers antérieur du bord externe pour arriver au milieu du bord de l'écusson, la tache située en arrière de la bande au devant de la partie apicale, est allongée, plus ou moins ovale, et comprise entre le médian et le radius.

Front à carène fort saillante, à stries transversales; vu de côté, il dessine un angle légèrement obtus; bord antérieur du vertex en angle aigu. Ocelles voisins l'un de l'autre, situés de chaque côté du renflement médian; pronotum finement ponctué, brillant, sans carène médiane; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 20 millimètres.

Longueur des élytres : 17,5 millim.; largeur des élytres : 5 millim.

Habitat : Pérou, Chinchamayo. (Le Moutl.)

Type : ma collection.

33. *Sphenorhina translucida* nov. sp.

Tête, sternum (sauf les côtés du prosternum qui sont brun rougeâtre), pattes noires; abdomen brun rouge. Pronotum tacheté de noir, au niveau des fossettes antérieures et dans la partie postérieure; partie antérieure de l'écusson noire, bords et partie apicale rougeâtres. Élytres densément ponctués, translucides, ocre jaune foncé; sur ceux-ci, deux bandes transversales amarantes, opaques, une près de la base et l'autre à la fin du second tiers. Ailes enfumées, plus fortement vers l'extrémité.

Sur le front une carène médiane saillante et des stries transversales bien

nettes; vu de côté il dessine un angle un peu plus grand que le droit, à bord antérieur convexe.

Bords latéro-antérieurs du pronotum relevés sur la partie antérieure de sa surface, une fine carène longitudinale, 2 épines sur les tibias postérieurs, une près de la base, l'autre non loin de l'extrémité.

Habitat : Équateur.

Longueur totale : 13 millimètres.

Longueur des élytres : 11 millim.; largeur des élytres : 4 millim.

Type : ma collection.

34. *Sphenorhina Lemoulti* nov. sp.

Noire, sauf la tête, les bords du prosternum, le pronotum, l'écusson et la base des élytres, métasternum ocre brun; front assez aplati sur les côtés, à carène médiane très saillante, à stries transversales latérales; vu de côté, il montre un angle droit saillant; bord antérieur du vertex triangulaire, ocelles très voisins séparés par une carène longitudinale. Pronotum légèrement ponctué, brillant, à fine carène longitudinale, partant du milieu du bord postéro-latéral un sillon assez court se dirige en avant et légèrement en dedans; 2 épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 16 millimètres.

Longueur des élytres : 14 millim.; largeur des élytres : 4 millim.

Habitat : Pérou, Chinchamayo. (Le Moutl.)

Type : ma collection.

Je dédie cette espèce à celui qui me l'a procurée, M. Le Moutl, de Paris.

35. *Triecphora speciosa* nov. sp.

Noire, une tache à la base des hanches, les articulations de celles-ci et des cuisses, des cuisses et des tibias, rouge carmin; base de l'abdomen rougeâtre; tibias postérieurs noir rougeâtre; sur les élytres noires, base, bord interne et nervure anale externe du clavus, radius, médian et cubitus, non loin de la base du corium jusqu'à la fin du troisième quart de la longueur, où ces nervures sont coupées par une ligne transversale ocre jaune.

Ailes enfumées. Sur le front 3 carènes longitudinales mousses et des stries transversales; vu de côté, il dessine un angle légèrement obtus; vertex quelque peu plus long que large entre les yeux; ocelles très voisins, séparés par une carène longitudinale; sur le pronotum finement ponctué et légèrement ridé, une fine carène longitudinale dans sa partie postérieure. Écusson long; sur celui-ci, 3 fossettes, 2 petites antéro-latérales et une grande médiane. Deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 17 millimètres.

Longueur des élytres : 15 millim. ; largeur des élytres : 4 millim.  
Habitat : Pérou, Chinchamayo (Le Moul).  
Type : ma collection.

36. *Triecphora proeminiata* var. *chiriquensis* nov. var.

Diffère du type par une tache noire à la partie postérieure du pronotum, la partie basale rouge est réunie à la bande transversale par une bande longeant le bord externe de l'élytre; étroite en son milieu et à bord interne concave.

Longueur totale : 14 millimètres.

Habitat : Colombie, Chiriqui.

Type : collection du Muséum national de Paris.

37. *Triecphora Bahiana* nov. sp.

Antennes, rostre, pattes et abdomen, noirs; bords latéraux du pronotum, base de l'abdomen et moitié supérieure des cuisses antérieures brun jaunâtre. Tête jaune; pronotum et écusson, brun jaune clair, pronotum plus nettement jaune près des bords antérieurs et latéro-antérieurs.

Élytres rouge carmin. Ailes enfumées, à base rouge. Sur la face supérieure de l'insecte une villosité jaunâtre. Sur le front, 3 carènes longitudinales le partageant en 3 parties, dont les 2 latérales sont aplaties, transversalement striées; vu de côté, fortement convexe, arrondi. 2 épines sur les tibias postérieurs, dont la seconde est très forte.

Longueur totale : 15 millimètres.

Longueur des élytres : 13 millim. ; largeur des élytres : 4 millim.

Habitat : Brésil, Bahia (R. Oberthur).

Type : collection du Muséum national de Paris et la mienne.

38. *Hyboscarta Melichari* nov. sp.

Vertex, pronotum, écusson et élytres brun chocolat foncé, corium traversé par deux bandes jaunes, la première à la fin du premier tiers, dirigée légèrement en arrière et s'étendant jusqu'à la suture clavo-coriale, la seconde à la fin du deuxième tiers et s'étendant du bord externe au bord interne, immédiatement après la pointe du clavus. Partie frontale du vertex, partie inférieure de la tête, premier article du rostre, sternum, abdomen, rouges. Second article du rostre, tarsi antérieurs et médians, extrémité des tarsi antérieurs et médians, extrémité des épines et des griffes des pattes postérieures, noirs.

Pronotum et front très inclinés. Front nettement partagé en 3 parties;

les 2 latérales aplaties et une bande médiane se creusant légèrement vers l'endroit où le front se recourbe et cette dépression est bordée de chaque côté d'une petite saillie dentiforme.

Vertex partagé en 3 parties par 2 sillons longitudinaux; la partie médiane est bombée et sur celle-ci se trouvent les ocelles qui sont petits et beaucoup plus près l'un de l'autre que des yeux.

Élytres très longs et étroits, rostre s'étendant jusqu'aux hanches médianes; une seule épine sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 14 millimètres.

Longueur des élytres : 12 millim. ; largeur des élytres, 3 millim.

Habitat : Brésil.

Type : collections du Muséum national de Paris, de M. Melichar, de Brno, et la mienne.

Je dédie cette espèce à M. Melichar, de Brno, en Tchéco-Slovaquie.