

XI. QUELQUES CERCOPIDES RECUEILLIS
AU NORD BORNEO (1927).

Par le Dr. V. LALLEMAND (Uccle).

[The species mentioned herein were taken in the lowlands of British North Borneo between June and September, 1927 by Mr. C. Boden Kloss and myself. All the species were found at Bettotan which is about 22 miles west by south of Sandakan, up the Bettotan river which runs into the head of Sandakan Bay:—a cleared, partially cleared, and forested expanse of undulating low country. H. M. Pendlebury.]

Liste des espèces.

- Clovia expressa* Wlk.
- Clovia borneensis* Lall. sp. n.
- Clovia borneensis* var. *sumatrana* Schm.
- Clovia bettotana* Lall. sp. n.
- Euclovia convexa* Dist.
- Plinia pilosa* Dist.
- Considia unimaculata* Schm.
- Eoscarta liternoides* Bredd.
- Eoscarta flavipes* Schm.
- Eoscarta pygmaea* Schm.
- Phymatostetha circumducta* Wlk.
- P. circumducta* var. *borneensis* Bthr.
- Ectemnonotum buxtoni* Bthr.

(48)

Descriptions des nouvelles espèces.

Clovia borneensis sp. n.

Front noir, de chaque côté de celui-ci une linge jaune se prolongeant sur le mésosternum; sur le vertex qui est jaune, trois lignes transversales et le bord postérieur noirs, les deux premières lignes n'atteignent pas les bords latéraux, la troisième s'étend d'un oeil à l'autre; pronotum noir traversé par une bande jaune; côtés de l'écusson noirs, sur le milieu une bande jaune s'étendant sur toute la longueur; élytres noirs, devenant jaune-brun en arrière, le long du bord interne depuis la partie postérieure du clavus et le long du tiers postérieur du bord externe; sur la clavus, une bande jaune partant de la base puis se coudant légèrement pour passer sur le corium en se dirigeant vers le milieu du bord externe qu'elle n'atteint pas; sur la partie apical du

corium, une bande jaune oblique partant du bord externe et se dirigeant vers l'angle apical, qu'elle n'atteint pas, elle est bordée du côté externe par une fine bande brune; clypeus, premier article du rostre, hanches, pattes, milieu du sternum d'un jaune plus ou moins brunâtre; les tibias antérieurs et l'abdomen sont plus brune; extrémité des épines et des tarsi noirs.

Longueur: 8 mm.

Habitat: N. Bornéo. Bettotan, nr. Sandakan (3 août 1927).
Clovia bettotana sp. n.

Partie supérieure brun-clair, recouverte d'une villosité dense et rousse; ailes hyalines, légèrement enfumées vers l'extrémité en dehors de la nervure circulaire, face inférieure légèrement plus claire; tarière, extrémité du rostre et des tarsi brun-noir; sur le bord antérieur de la tête, au devant de la partie frontale du vertex une ligne noire. Deux fortes épines sur les tibias postérieurs.

Longueur: 7 mm.

Habitat: N. Borneo, Bettotan, nr. Sandakan (du 22 au 27 Juillet 1927).